CONDITIONNEMENT – INDÉPENDANCE

1) PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Définition :

Soit A et B deux événements tels que $P(B)\neq 0$.
On appelle « **probabilité conditionnelle de A par rapport à B** » ou « **probabilité de A sachant B**» le réel, noté $P_B(A)$ (parfois noté $P(A/B)$ défini par :

$$P_B(A)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$$

Exemple :

Un lycée a présenté 356 candidats au bac, dont 96 en série S. 256 élèves ont été admis à l'examen ; parmi eux 64 provenaient de la série S.
Un élève étant choisi au hasard parmi les candidats présentés par le lycée, on note A l'événement : « l'élève provient de la série S » et B l'événement : « l'élève a été reçu au bac ».
Chaque élève a la même chance d'être choisi ; par équiprobabilité, on a donc :

$P(A)=\frac{96}{356}$, $P(B)=\frac{256}{356}$ et $P(A\cap B)=\frac{64}{356}$

On en déduit que $P_B(A)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{64}{256}=\frac{1}{4}=0{,}25$

La probabilité que l'élève provienne de la série S **sachant qu'il est reçu au bac**, est donc égale à $0{,}25$.

En général :
$P_B(A)\neq P_A(B)$

On a aussi $P_A(B)=\frac{P(B\cap A)}{p(A)}=\frac{P(A\cap B)}{p(A)}=\frac{64}{96}=\frac{2}{3}$

Ainsi la probabilité que l'élève soit reçu au bac **sachant qu'il provient de la série S** est $\frac{2}{3}$.

Remarques :

- Si $A\subset B$, alors $A\cap B=A$ et $P_B(A)=\frac{P(A)}{P(B)}$
- Si $B\subset A$, alors $A\cap B=B$ et $P_B(A)=\frac{P(B)}{P(B)}=1$

Propriétés :

Soit A et B deux événements tels que $P(B)\neq 0$. On a :

$$0\leqslant P_B(A)\leqslant 1 \quad \text{et} \quad P_B(\overline{A})=1-P_B(A)$$

2) PROBABILITÉ D'UNE INTERSECTION

Propriété : *Formule des probabilités composées*

Soit A et B deux événements tels que $P(B)\neq 0$ et $P(A)\neq 0$. On a :

$$P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B) \quad \text{et} \quad P(A\cap B)=P(B)\times P_B(A)$$

Ces égalités se déduisent de la définition précédente.

Ces deux égalités se retiennent assez facilement : pour que l'événement A et B soit réalisé, il faut d'abord que l'événement A le soit, et sachant que l'événement A est réalisé, il faut ensuite que l'événement B le soit aussi …

Exemple :

Une urne contient trois boules bleues et cinq rouges, indiscernables au toucher.
On tire au hasard une première boule de l'urne . Si elle est bleue, on la remet dans 1'urne et on rajoute une autre boule bleue ; si elle est rouge, on ne la remet pas dans l'urne . On tire ensuite, au hasard, une seconde boule de l'urne.
On s'intéresse à la probabilité pour que les deux boules extraites soient bleues.

B_1 est l'événement : « la première boule extraite est bleue » ; B_2 est l'événement : « la seconde boule extraite est bleue ».
L'événement « les deux boules extraites sont bleues » est alors $B_1\cap B_2$.

On a $P(B_1\cap B_2)=P(B_1)\times P_{B_1}(B_2)$

Les boules ont la même chance d'être tirées ; par équiprobabilité, on a donc : $P(B_1)=\frac{3}{8}$

B_1 étant réalisé, on rajoute une boule bleue, si bien qu'au moment du second tirage il y a 4 boules bleues sur 9 boules dans l'urne.


Ce qui permet d'écrire $P_{B_1}(B_2)=\frac{4}{9}$

On en déduit : $P(B_1\cap B_2)=\frac{3}{8}\times\frac{4}{9}=\frac{1}{6}$.

La probabilité que les deux boules extraites soient bleues est donc égale à $\frac{1}{6}$

3) RÈGLES DE CONSTRUCTION D'UN ARBRE PONDÉRÉ (ou arbre de probabilités)

Ω est l'univers des événements élémentaires d'une expérience aléatoire . A_1 , A_2 , … , A_n désignent des événements de Ω .




Définition :

Dire que A_1 , A_2 , … , A_n réalisent **une partition** de l'univers Ω , signifie que :
- les événements A_1 , A_2 , … , A_n sont deux à deux disjoints
- $A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n = \Omega$

Pour déterminer des probabilités, on peut être amené à construire des arbres dont les branches sont affectées de probabilités.

- Un arbre pondéré se construit et se lit de gauche à droite.
- L'origine de l'arbre est la **racine** de l'arbre.
- Les traits partant de la racine sont appelés **branches primaires** de l'arbre. Elles mènent à des **nœuds**.
- Les branches joignant deux nœuds sont dites **secondaires.**
- Tout chemin menant de la racine à un nœud est appelé **trajet.**




Règles :

1. Les événements qui se trouvent aux extrémités des branches primaires forment une **partition** de l'univers Ω .
2. Le **poids** d'une branche primaire est la **probabilité** de l'événement qui se trouve à son extrémité.
3. Le poids d'une branche secondaire est la **probabilité conditionnelle** de l'événement qui se trouve à son extrémité sachant que le trajet menant à son origine a été réalisé.
4. Le poids ou la probabilité d'un trajet est le **produit** des poids des branches le constituant. *(Probabilités composées)*
5. La probabilité d'un événement associé à plusieurs trajets complets est la **somme** des probabilités de ces trajets. *(Probabilités totales)*

Remarques :
- La somme des poids des branches primaires vaut 1. *(règle 1)*
- La somme des poids des branches secondaires issues d'un même nœud vaut 1.

Exemple :

Une urne contient trois boules bleues et deux boules rouges.
On tire successivement et sans remise trois boules de l'urne.
L'expérience aléatoire peut être décrite par l'arbre pondéré suivant :




- La probabilité que la troisième boule soit rouge sachant que les deux premières étaient bleues est $\frac{2}{3}$. *(règle 3)*
- La probabilité de l'événement (B , B , B) est $\frac{1}{10}$ *(règle 4)*
- Soit A l'événement : « tirer une seule boule rouge » .

A est associé aux trajets (R , B , B) , (B , R , B) et (B , B , R).
On a :
$P(A) = P(R , B , B) + P(B , R , B) + P(B , B , R) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ *(règle 5)*

Remarque :
Pour des expériences indépendantes, la probabilité de la liste des résultats est le produit des probabilités de chaque résultat.

Exemple :

Un test d'une maladie est effectué sur la totalité d'une population.
Une étude statistique établit que 70 % de la population réagit négativement au test (événement N) , 20 % réagit faiblement au test (événement F) et 10 % réagit fortement au test (événement R).
La probabilité pour une personne de cette population d'être atteinte de la maladie (événement M) est :
- 0,9 lorsque le test est fortement positif
- 0,6 lorsque le test est faiblement positif
- 0,05 lorsque le test est négatif



Par hypothèse, on a donc :

$P(R) = 0,1$, $P(F) = 0,2$, $P(N) = 0,7$, $P_R(M) = 0,9$, $P_F(M) = 0,6$ et $P_N(M) = 0,05$

Les événements R , F et N constituent une partition de la population.

D'après l'arbre pondéré, on a :

$P(M) = P(R) \times P_R(M) + P(F) \times P_F(M) + P(N) \times P_N(M) = 0{,}1 \times 0{,}9 + 0{,}2 \times 0{,}6 + 0{,}7 \times 0{,}05 = 0{,}245$

La probabilité pour qu'une personne de cette population soit atteinte de la maladie est donc égale à $0{,}245$

4) ÉVÈNEMENTS INDÉPENDANTS

Deux évènements A et B de probabilités non nulles sont dits **indépendants** si le fait que l'un d'entre eux soit réalisé ou non n'influe pas la probabilité que l'autre soit réalisé, c'est à dire :
si $P_B(A) = P(A)$ ou si $P_A(B) = P(B)$
En utilisant la propriété précédente, on constate que l'indépendance de A et B se traduit par la relation $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Définition :

Soit A et B deux événements de probabilités non nulles.
A et B sont dits **indépendants** s'ils vérifient l'une des trois conditions équivalentes suivantes :

- $P_B(A) = P(A)$
- $P_A(B) = P(B)$
- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Exemple :
Une urne contient quatre boules bleues numérotées b_1 , b_1 , b_2 et b_3 , et six boules rouges numérotées r_1 , r_1 , r_1 , r_2 , r_3 et r_4.
On suppose toutes ces boules indiscernables au toucher, et on en tire une au hasard.
On considère les événements :
B : « la boule tirée est bleue » ; R : « la boule tirée est rouge » ; Q : « la boule tirée porte le numéro 4 » ; U : « la boule tirée porte le numéro 1 ».
Les boules ont la même chance d'être tirées ; par équiprobabilité, on a donc :

$P(U) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; $P(B) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ et $P(B \cap U) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

On a : $P(B \cap U) = P(B) \times P(U)$
Les événements B et U sont donc indépendants .

Ce résultat s'explique en remarquant que la proportion des boules bleues portant le numéro 1 parmi les boules portant le numéro 1 est la même que celle des boules bleues parmi les boules de l'urne.
On a aussi $P(Q) = \frac{1}{10}$, $P(B) = \frac{2}{5}$ et $P(Q \cap B) = 0$

On a : $P(B \cap Q) \neq P(B) \times P(Q)$

Les événements B et Q ne sont donc pas indépendants .

Remarques :

- Tout évènement A est indépendant de l'évènement certain et de l'évènement impossible.
- Ne pas confondre événements **incompatibles** et événements **indépendants**.

Deux événements A et B sont incompatibles si et seulement si $A \cap B = \emptyset$. On a alors : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Dans l'exemple précédent, les événements B et U sont indépendants, mais non incompatibles ; les événements B et Q sont incompatibles et non indépendants.

Propriété :

Soit A et B deux événements de probabilités non nulles.
Si A et B sont deux événements indépendants , alors il en est de même pour $\overline{A}$ et B.