Nombre dérivé :


Le nombre dérivé est noté $f'(a)$, et on a :

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$ (si la limite existe, on dit alors que f est **dérivable** en a)

Interprétation géométrique :

Le coefficient directeur de la droite (AM) est : $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

La tangente à C_f au point A se conçoit comme la droite « position limite » des sécantes (AM) lorsque M tend vers A en restant sur la courbe. (h tend vers 0)
Si f est dérivable en a, la « position limite » de ces sécantes a pour coefficient directeur $f'(a)$, et passe par A.



Équation de la tangente :
au point $A(a;f(a))$

$y=f'(a)(x-a)+f(a)$ (Si f est dérivable en a)

Approximation de *f(a+h)* :

Pour h proche de zéro, on a $f(a+h)\approx f(a)+hf'(a)$

Cas particuliers:

- Si $f'(a)=0$, C_f admet au point d'abscisse a **une tangente horizontale** d'équation $y=f(a)$.

Fonction non dérivable :

- Si $\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=+\infty$ (ou $-\infty$) , f n'est pas dérivable en a


  C_f admet **une tangente verticale** d'équation $x=a$.

  Exemple classique de la fonction racine carrée en 0
  la droite d'équation $x=0$ est tangente verticale à la courbe à l'origine du repère.



- Si C_f admet une pointe au point d'abscisse a alors la fonction n'est pas dérivable en a .

  Exemple classique de la fonction valeur absolue en 0



Formules :

On dit qu'une fonction f est **dérivable** sur un intervalle I si pour tout x appartenant à I, le nombre dérivé de f en x existe.

Fonction f	Fonction dérivée f'	Ensemble de dérivabilité
$f:x\mapsto k\ (k\in\mathbb{R})$	$f':x\mapsto 0$	$\mathbb{R}$
$f:x\mapsto x$	$f':x\mapsto 1$	$\mathbb{R}$
$f:x\mapsto\sqrt{x}$	$f':x\mapsto\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$
$f:x\mapsto x^n\ (n\in\mathbb{N}^*)$	$f':x\mapsto n\,x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f:x\mapsto\frac{1}{x}$	$f':x\mapsto-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$f:x\mapsto\frac{1}{x^n}\ (n\in\mathbb{N}^*)$	$f':x\mapsto-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$

Opérations sur les fonctions dérivables :

Soit u et v deux fonctions dérivables sur D et k un réel, alors :

- Les fonctions $k\cdot u$, $u+v$ et $u\cdot v$ sont dérivables sur D et:

$$(k\cdot u)'=k\cdot u' \quad , \quad (u+v)'=u'+v' \quad \text{et} \quad (u\cdot v)'=u'\cdot v+u\cdot v'$$

- Si pour tout réel a de D, $v(a)\neq 0$, les fonctions $\frac{1}{v}$ et $\frac{u}{v}$ sont dérivables sur D et:

$$\left(\frac{1}{v}\right)'=-\frac{v'}{v^2} \quad , \quad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'\cdot v-v'\cdot u}{v^2}$$

Composée avec une fonction affine :

Soit a et b deux réels et g une fonction dérivable sur un intervalle I.
Pour tout réel x, tel que $ax+b\in I$, la fonction f définie par $f(x)=g(ax+b)$ est dérivable , et on a :

$$f'(x)=ag'(ax+b)$$